

# Avertissements agricoles



Bulletin technique n° 9 du 28 avril 1989

Abonnement annuel : 190 F

- \* **CEREALES A PAILLE** : le point sur les maladies
- \* **COLZA** : une faible activité du charançon

## \*\* CEREALES A PAILLE \*\*

### -----MALADIES SUR BLE

► **MALADIES DU PIED** : la présence fréquente de Fusariose se confirme mais aucune extension n'est observée.

► **MALADIES FOLIAIRES :**

La **Septoriose** progresse dans de nombreux secteurs sur F4 et gagne les F3. Un passage sur F2 est noté aux alentours de Wissembourg.

L'**Oïdium** se généralise sur F4 et se développe sur F3 ; rarement sur F2. Attention, une parcelle dans le secteur d'Obersaasheim est attaquée à 100 % sur F4, 90 % sur F3, 60 % sur F2.

Les rouilles ne peuvent se développer en raison des conditions fraîches et humides.

### -----LEMAS

Des attaques de moyenne intensité sont signalées en Alsace Bossue.

### -----MALADIES SUR ORGE

L'**Helminthosporiose** se manifeste en diverses situations, jusque sur la deuxième feuille. L'**Oïdium** et la **Rhynchosporiose**, bien développés sur F3 et F4, sont inquiétants dans la région de Wissembourg notamment.

## \*\* COLZA \*\*

### -----CHARANCON DES SILIQUES

Bien qu'actuellement les captures demeurent faibles et entrecoupées par les pluies, il sera important d'estimer régulièrement la population de charançon des siliques **à partir du stade "dix premières siliques entre 2 et 4 cm"** à 10 m de la bordure de la parcelle. Ce contrôle vous permettra d'intervenir dès que vous observerez **au moins 1 charançon toutes les 2 plantes**. Aucun traitement ne doit être réalisé avant le stade indiqué ci-dessus.

Les matières actives et les doses utilisables pour le traitement contre le Charançon des Siliques sont parus dans le bulletin n° 23 du 20 septembre 1988.

En résumé, ce sont : alphaméthrine, bifenthrine, bromophos, cyfluthrine, cyperméthrine, deltaméthrine, dia-liphos, endosulfan, fenvalérate, lambda-cyhalothrine et phosalone. A cette liste s'ajoute l'esfenvalérate nouvellement autorisé contre ce ravageur (Sumi-alpha à 0,6 l/ha).

**Pyréthrinéoïde de synthèse : traiter en dehors des heures de butinage des abeilles (le soir).**

### -----PUCERONS CENDRES

Les colonies sont rares et peu développées.

Imprimerie de la Station de STRASBOURG  
Directeur-Gérant : P. BERTHIER

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
D. R. A. F.  
Service Régional de la Protection des Végétaux

Cité Administrative  
67084 STRASBOURG CEDEX

☎ 88.37.32.18  
Bas-Rhin : 88.69.65.89 - Haut-Rhin : 89.72.49.70

Publication périodique

CPPAP n° 1848 AD

Abonnement annuel : 180,-F



P 348